

## рапица



### Вуксал Микроплант

**1 x 200 мл**  
след 2-4 лист

### Вуксал Бор

**2 x 200-300 мл/гка**

от начало на активен растеж  
до начало на цъфтеж

### Вуксал Сяра

**1 x 300-500 мл**  
след 2-4 лист

### Вуксал Сяра

**2 x 300-500 мл/гка**

от начало на активен растеж  
до начало на цъфтеж



Забележка: За по-добри резултати комбинирайте Вуксал Сяра с Вуксал Бор.  
НЕ прилагайте Вуксал Сяра по време на цъфтеж!

## житни култури



Вуксал  
Териос  
**100-140  
мл/100 кг**

### Вуксал Макромикс

**2 x 200-500 мл/гка**

### Вуксал Сяра

**1 x 300-500 мл/гка**

### Вуксал Топ N

**1 x 500-1000 мл/гка**

### Вуксал

### Микроплант

**1 x 200 мл/гка**  
(самостоятелно  
или в комбинация)



Забележка: Вуксал Микроплант може да се комбинира с NPK-съдържащи водоразтворими листни торове или с 0,5-1 кг/гка карбамид.

# ябълки

Листни торове при  
производството на ябълки



**Вуксал Бор**  
2 x 100-200 мл/г/ка

**Вуксал Макромикс**  
5 x 400-500 мл/г/ка

**Вуксал Калций**  
5 x 400-500 мл/г/ка

прибиране на реколтата

**Вуксал Бор**  
200 мл/г/ка след  
беритба



**Внимание: Не смесвайте Вуксал Калций с Вуксал Бор!**

# ЛОЗЯ

Листни торове при лозята




**Вуксал Бор**  
100-200 мл/г/ка

**Вуксал Бор**  
100-200 мл/г/ка

**Вуксал К 40** 3 x 300-500 мл/г/ка

**Вуксал Калций** 2 x 500 мл/г/ка

**Вуксал Макромикс**  
3 x 300-500 мл/г/ка



5-6 лист

цъфтеж

след  
цъфтеж

затваряне  
на грозда

прошарване