




От семената до  
успешната реколта



# Резитби при краставици


Формировка за къс ден



При растеж, от пазвата на всяка листна дръжка, растението формира плод (завръз) и колтук.


1

По централното стъбло до **6-ти** същински лист включително (не се броят котиледонните листенца), се **чистят всички колтуци и завръзи**.




2

Първи плод за реколтиране се оставя на **7-ми** лист. По този начин се дава време на растението да изгради кореновата система и да акумулира достатъчна енергия от растеж, преди да започне храненето на плодовете.



3

На **8-ми** лист се прави прореждане,  
като се премахват завръза и колтука



4

На **9-ти** и **10-ти** лист се премахват колтуците, но се запазват завръзите (2-ри и 3-ти плод на растението).



5

На **11-ти** лист отново се прави прореждане, като се премахват завръза и колтука.

*При мощен растеж и благоприятни климатични условия, може да се запази и този плод.*



6

На **12-ти** лист се прави пълно натоварване, като **се запазва всеки завръз** на централното стъбло, но се **премахват колтуците**.




7

Когато растението достигне височина около **30-40 см** от носещата тел, от пазвите на два последователни листа **оставяме по 1 колтук**. Тези колтуци **съкращаваме на по 3 листа**, от чиито пазви растението ще заложи плодове.

Тук **не оставяме колтуци от II порядък** (колтук от пазвата на листо на колтук), а **само плодовете**.

Тези **6 плода** имат за цел да уплътнят прехода на беритбата от централно стъбло към колтуци.






8

Когато височината на растението **премине носещата тел**, то се насочва едностранно по него (обикновено с две премятания) и се **съкращава на 5-6 листа**, достигайки близо до стъблото на следващото растение.



носеца  
тел




9

От **5-те листа**, оставени по праметнатото върху носещата тел централно стъбло, избиват **колтуци от I порядък**, които трябва да оставим да висят надолу. Всеки от тези колтуци се **съкращава на 4 листа**.



10

Оставя се по **1 плод** от всеки лист и по **1 колтук** от II порядък (колтук от колтука). На всеки колтук от II и следващ порядък, се оставят само по **2 плода**, за да не се претовари растението.



**Листата, които излизат от праметнатото по носещата тел стъбло**, с времето стават много големи и подобно на чадъри, хвърлят сянка върху растящите надолу колтуци. Това може да редуцира плододаването. Препоръчва се **при започване на плододаването от колтуци**, да се **отстраняват тези листа**, като първоначално се махат през един, а в последствие и останалите.



Краставичното растение позволява отглеждането на дълга вегетация и плододаване на колтуци от III, IV и повече порядъци. За **поддържане на високо качество на продукцията** е важно да се осигури:

12

- Добра осветеност
- Балансирано хранене
- Подходяща растителна защита
- Навременна обработка на растенията
- Да не се претоварват растенията с плодове

## Хибриди краставици подходящи за къс ден



### Балдер F1



HR = Cca / Ccu

IR = Gc / Px



За условия на минимална  
слънчева светлина

### Македон F1



HR = Cca / Ccu / CVYV

IR = CMV



Запазва качеството през  
цялата вегетация

### Палермо F1



HR = Cca / Ccu

IR = Gc / Px



С отворен хабитус, за по-  
лесно огряване от слънцето

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ НА [www.syngenta.bg](http://www.syngenta.bg)